

Boletín de Plagas 7/13/02

Alertas:

Barrenillo de fresno esmeralda -- Se ha descubierto esta plaga exótica oriunda de la zona oriental de Rusia, del norte de China, Japón y Corea infestando árboles de fresno en la zona sudoriental de Michigan. El escarabajo crea galerías larvales en zigzag y orificios de emergencia con forma de D en los fresnos blancos y verdes.

Observaciones en viveros:

Devorador de hojas de olmos – Los olmos híbridos en un vivero del Condado de Waukesha sufrieron daños moderados a extensos.

Devorador de hojas de abedules – Se observaron daños minúsculos a ligeros en abedules de copa blanca y fluviales en viveros de los Condados de Kenosha y Waukesha.

Escarabajo importado de hojas de sauces – Se observaron cantidades ligeras de daños en sauces tirabuzón en un vivero del Condado de Waukesha.

Escarabajo japonés – Había una gran cantidad de adultos en el Condado de Kenosha esta última semana. Las plantas con mayores daños fueron: roble blanco, olmo tipo "camperdown", avellano americano, amelanquier negro, viburno de arándanos y cambrón de ceto vivo alto.

Barrenillo de corona de viburno – Los viburnos americanos compactos demostraron señales de coloración otoñal en un vivero del Condado de Kenosha. Una investigación posterior reveló una infestación importante por el **barrenillo de corona**.

Saltarillas – Se observaron cantidades importantes de daños en arces rojos y sacarinos en un vivero del Condado de Kenosha.

Devorador de hojas de roble – Las larvas aún estaban en proceso de alimentación activa en robles ingleses y de los pantanos en viveros de los Condados de Kenosha y Waukesha.

Abejorro de rosas – Se informó de cantidades moderadas de daños por alimentación en rosas del Condado de Waukesha.

Chinche de planta de fresno – Los fresnos verdes en los viveros de los Condados de Kenosha y Milwaukee tuvieron cantidades ligeras a moderadas de daños.

Áfido de hamamelis espinoso – Se encontraron números ligeros a moderados de áfidos en abedules fluviales en viveros de los Condados de Kenosha y Milwaukee.

Antracnosis – Se observaron cantidades ligeras a moderadas de manchas en las hojas de robles, abedules, olmos, fresnos y arces en viveros de los Condados de Kenosha, Vernon y Waukesha.

Manchas de hojas Guignardia – Castaños de Indias en viveros de los Condados de Kenosha, Vernon y Waukesha presentaron cantidades ligeras a moderadas de hojas afectadas por este hongo patógeno.

Costra de manzano – Se encontraron cantidades moderadas de costras en manzanos silvestres susceptibles en viveros de los Condados de Kenosha, Milwaukee y Waukesha.

Virus de mancha necrótica en Impatiens – Números pequeños de plantas en diversos viveros y cultivadores en Door, Iowa presentaron síntomas de esta enfermedad viral. Las plantas afectadas incluyen: impatiens de Nueva Guinea, begonia tuberosa, impatiens.

Lagarta – Un vivero del Condado de Ozaukee tuvo gusanos de **lagarta** que causaron defoliación.