

/Spanish version/ 9/06/02

Excoriación de flor de fresno – Se encontró esta plaga tipo ácaro en cantidades minúsculas en fresnos verdes y fresnos enanos de un vivero del Condado de Ozaukee.

Áfido rizador de hojas de fresno – Este insecto fue observado en fresnos verdes en un área localizada del campo de un vivero, ocasionando daños ligeros, en el Condado de Calumet.

Chinche de planta de fresno – Se encontraron ninfas ocasionando cantidades ligeras de daños en fresnos verdes de viveros de los Condados de Calumet, LaCrosse y Pepin.

Gusano de bolsa – Se encontró este insecto más sureño en grandes cantidades de árboles de la vida, en un área localizada de un vivero del Condado de Ozaukee.

Barrenillo de abedul bronceado – Ocurrió una infestación localizada causando daños grandes en abedules de papel en un vivero del Condado de Ozaukee.

Gusano de telarañas otoñales – En su gran mayoría han finalizado su alimentación, pero algunos aún se pueden encontrar en la etapa de gusano. Se encontraron larvas en viveros de los Condados de Calumet y Ozaukee.

Saltarillas – Este insecto común se encontró causando daños en arces rojos, acacias negras y perales ornamentales en cantidades ligeras a abundantes, en los Condados de Chippewa y Ozaukee.

Escamas de leucanium – Se observaron cantidades minúsculas en fresnos de un vivero del Condado de Ozaukee.

Barrenillo de tilos – Se informaron de daños en los troncos de tilos más grandes en viveros de los Condados de Calumet y Ozaukee. Los daños ocurrían desde la tierra hasta el comienzo de la ramificación en estos árboles.

Devorador de agujas de abeto – Los abetos blancos de un vivero del Condado de Pierce presentaron cantidades moderadas de daños.

Gorgojo verde pálido – Se encontró a este pequeño gorgojo verde alimentándose en tilos del Condado de Ozaukee, causando daños en cantidades ligeras a moderadas.

Babosas de perales – Se observaron larvas en tamaños de 1/16 a 1/2 pulgada de largo en cerezos de un vivero del Condado de Douglas, causando daños moderados.

Escarabajuelo de cabeza roja – Se encontraron daños de este insecto en weigela y cornejos, en cantidades ligeras a moderadas, en viveros de los Condados de Calumet y Ozaukee.

Gusano de cuello amarillo – Casi concluida su etapa como gusano para esta temporada, aún se encuentran algunos en etapas posteriores de su crecimiento. Los gusanos se estaban alimentando en abedules fluviales en un área localizada, causando una defoliación abundante, en un vivero del Condado de Ozaukee.