

/Spanish/

Adélgido de agallas de abetos orientales – Los abetos blancos y negros en viveros de los Condados de Dodge, Oconto, Sheboygan y St. Croix presentaron números ligeros a moderados de agallas.

Arador eriódido – Se registraron diversas distorsiones de hojas en arces plateados, nogales, abedules fluviales y tilos en viveros de los Condados de Dodge, Jefferson, Ozaukee, Sheboygan y St. Croix.

Escarabajo japonés – Se registraron cantidades abundantes de daños por alimentación en malva real y ligularia en un vivero del Condado de Racine.

Saltarillas – Se observaron cantidades moderadas a graves de daños en diversas especies de arce, raigón del Canadá, álmez, arbusto de arvejas siberianas y manzano silvestre en los Condados de Jefferson, Portage, Racine, Sheboygan y St. Croix. Se observaron hasta cuatro o cinco **saltarillas** en olmos tipo "nuevo horizonte" en el Condado de Jefferson.

Ácaro rojo de abetos – Se encontraron cantidades abundantes de lesiones por alimentación de este ácaro en abetos de Colorado en un vivero del Condado de Dodge. Los daños fueron ligeros en árboles de la vida color esmeralda en un vivero del Condado de Jefferson.

Manchas negras – Se observaron cantidades ligeras a abundantes de manchas en las hojas de diversas rosas en viveros de los Condados de Jefferson, Rock, Racine, Sheboygan y St. Croix.

Mohos en membrillos de cedro – Los espinos tipo espolón de gallo sin espinas en los viveros de los Condados de Jefferson, Lafayette y Racine presentaron cantidades moderadas de este moho que infecta frutas y ramas.

Fuego (botritis) – Se encontró una infección grave en los lirios asiáticos de un vivero del Condado de Rock. La esclerosia puede permanecer viable en la tierra durante muchos años y, una vez establecida, se convertirá por lo general en un problema anual.

Mohos de gimnosporangios – Se observaron cantidades de minúsculas a abundantes de mohos en diversas especies de espinos en viveros de los Condados de Dodge, Jefferson, Lafayette, Rock, Racine y St. Croix.

Virus de mancha necrótica en impatiens – Se encontró que pequeños números de plantas de impatiens de Nueva Guinea fueron infectadas con este virus en un vivero del Condado de Rock.

Rizado de hojas de durazno – Se observaron cantidades ligeras de distorsiones en las hojas de duraznos de hojas rojas en un vivero del Condado de Jefferson.

Moho de agallas de pino – Se observaron cantidades minúsculas a abundantes de agallas en pinos escoceses en viveros de los Condados de Oconto, Ozaukee y Waukesha.

Enfermedad de orificios con forma de bala – Se observaron cantidades ligeras a abundantes de orificios con forma de bala en ciruelos de hojas violetas, cerezos silvestres rojos canadienses, ciruelos de Newport y cerezos de Nanking en viveros de los Condados de Dodge, Jefferson y Rock.

Manchas de alquitrán – Se observaron cantidades ligeras a moderadas de manchas negras en arces plateados y rojos en viveros de los Condados de Dodge, Marinette, Ozaukee, Racine y Sheboygan.